

「丁基拉草」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 3 月 11 日農授防字第 1111488422C 號公告修正

32 (%) (w/w) 丁基拉草 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	5-6 公升		插秧前					<ol style="list-style-type: none"> 1. 防除移植本田雜草。雜草萌前處理(可兼用於萌後處理)。 2. 插秧前 2-4 日蓋平田面後保持 3-5 公分水深將藥劑直接均勻撒佈，並保持積水至插秧。 3. 插秧當日排水，插秧後灌水 3-5 公分應保持 3-5 日。 	

60 (%) (w/w) 丁基拉草 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	2.5-3公升	200	插秧後2-4日,草1葉時。					1. 防除秧田雜草,保持積水3-5日。 2. 地區第一期作每公頃施藥量切勿超過2.5公升。	
結球白菜	雜草	1公升	1,000	播種後均勻噴施於畦面。					1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象:鵝兒腸、小葉灰藿、馬唐草、鬼針草等一年生草。	查未訂有農藥殘留容許量標準,本項刪除。
結球萵苣	雜草	1公升	1,000	播種後均勻噴施於畦面。					1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象:鵝兒腸、小葉灰藿、馬唐草、鬼針草等一年生草。	查未訂有農藥殘留容許量標準,本項刪除。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
薤菜	雜草	1 公升	1,000	播種後 均勻噴 施於畦 面。					1. 施藥後 土壤應 保持濕 潤狀態。 2. 防除對 象：鵝兒 腸、小葉 灰藿、馬 唐草、鬼 針草等 一年生 草。	
小白菜	雜草	1 公升	1,000	播種後 均勻噴 施於畦 面。					1. 施藥後 土壤應 保持濕 潤狀態。 2. 防除對 象：鵝兒 腸、小葉 灰藿、馬 唐草、鬼 針草等 一年生 草。	
油菜	雜草	1 公升	1,000	播種後 均勻噴 施於畦 面。					1. 施藥後 土壤應 保持濕 潤狀態。 2. 防除對 象：鵝兒 腸、小葉 灰藿、馬 唐草、鬼 針草等 一年生 草。	
青江菜	雜草	1 公升	1,000	播種後					1. 施藥後	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				均勻噴施於畦面。					2. 土壤應保持濕潤狀態。 防除對象：鵝兒腸、小葉灰藿、馬唐草、鬼針草等一年生草。	
芥藍	雜草	1 公升	1,000	播種後均勻噴施於畦面。					1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：鵝兒腸、小葉灰藿、馬唐草、鬼針草等一年生草。	
芥菜	雜草	1 公升	1,000	播種後均勻噴施於畦面。					1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：鵝兒腸、小葉灰藿、馬唐草、鬼針草等一年生草。	
不結球 萵苣與	雜草	1 公升	1,000	播種後均勻噴					1. 施藥後土壤應	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
半結球 萵苣				施於畦面。					2. 保持濕潤狀態。 防除對象：鵝兒腸、小葉灰藿、馬唐草、鬼針草等一年生草。	
茼蒿	雜草	1 公升	1,000	播種後均勻噴施於畦面。					1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：鵝兒腸、小葉灰藿、馬唐草、鬼針草等一年生草。	
菠菜	雜草	1 公升	1,000	播種後均勻噴施於圃面。					施藥後土壤應保持濕潤狀態。	
莧菜	雜草	1 公升	1,000	播種後均勻噴施於畦面。					1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：鵝兒腸、小葉灰藿、馬唐草、鬼針草等一年生	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									草。	
水稻	雜草	3 公升	加水稀釋至 20 公升				<ol style="list-style-type: none"> 適用於無人飛行載具，藥滴體積中值粒徑 (VMD, Volume Media Diameter) 應大於 145 微米。 插秧後 2 ~ 4 日，田面雜草之生長為萌芽至 1 葉時施藥。 		<ol style="list-style-type: none"> 防治水稻移植本田雜草。 風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。 為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。 操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。 無人飛行載具飛行參數請參閱防檢局農藥資訊服務相關網站。 	本項新增。

5.000%) (w/w) 丁基拉草 粒劑 (GR)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	30 公斤		播種前。					防除秧田雜草，床畦做好後，畦面保持濕潤狀態下施藥；以木鏟蓋平床面播種，並繼續保持濕潤狀態3-5天。	
水稻	雜草	25 公斤		播種後。					防除中間作直播田雜草，播種後6-7天田間保持3公分水深時施藥，然後使積水自然乾燥，經3-4天再灌水，以後按一般田間管理方式灌排水。	
水稻	雜草	40 公斤		播種前後。					防除濕田直播雜草，播種前2天在濁水狀先施藥半量保持3-5公分積水，播種時排水，播後保持濕潤，第2次施藥在第1期作10-15天，2期作7-10天在淺水狀態再施半量。	
水稻	雜草	30 公斤		插秧前後。					1. 防除移植本田雜草。雜草萌後處	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									<p>理。</p> <p>2. 萌前處理(兼用萌後處理): 插秧前2-4日保持3-5公分水深施藥並積水至插秧; 插秧當日排水, 插秧後灌水3-5公分保持3-5日。</p>	